

برآورده ترکیب پذیری و اثرات ژن در ارقام و لاینهای برنج از طریق تجزیه لاین × تستر

عباس حاجی پور باقری^۱، قربانعلی نعمت زاده^۲، سیدعلی پیغمبری^۳ و محمد نوروزی^۴

۱، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۲، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

۳، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ۴، کارشناس مؤسسه برنج کشور (آمل)

تاریخ پذیرش مقاله ۸۳/۱/۲۶

خلاصه

در برنامه‌های اصلاحی به روش تلاقی برای دستیابی به نتایج مطلوب، انتخاب منطقی و آگاهانه والدین براساس تعیین قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و چگونگی اثرات ژن می‌باشد. براین اساس در این تحقیق با استفاده از ۶ لاین بعنوان پایه مادری و ۳ تستر بعنوان پایه پدری و با استفاده از تلاقی لاین × تستر در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی اهداف فوق بررسی گردید. تعداد ۹ والد (۶ لاین و ۳ تستر) به همراه ۱۸ نتاج F1 حاصل از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و صفاتی مانند ارتفاع بوته، طول و عرض برگ پرچم، تعداد دانه پر و پوک در خوشة، طول و عرض دانه تعداد پنجه مفید، طول خوشة، وزن هزار دانه، روز تا رسیدگی و عملکرددانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادکه واریانس تلاقی های برای کلیه صفات به جز برای صفت تعداد پنجه در سطوح ۰/۵٪ و ۰/۱٪ معنی دار شدند، واریانس لاینها برای اکثر صفات بجز صفات طول دانه و عملکرد دانه معنی دار بود. واریانس تسترهای برای صفات ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول خوشة، دانه پر در خوشة، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار بود و برای بقیه غیرمعنی دار بود. واریانس لاین × تسترهای صفات عملکرددانه، ارتفاع بوته و تعداد دانه پوک در خوشة، عرض برگ پرچم، طول خوشة، تعداد دانه پر در خوشه معنی دار بوده برای بقیه غیرمعنی دار می باشد. برآورده ترکیب پذیری عمومی نشان دادکه لاین شماره ۱۰ و تسترشماره ۳ بهترین ترکیب شونده عمومی برای طول خوشه می باشد، لاین ۴ برای صفات دانه پر در خوشه بود. برآورده ترکیب پذیری خصوصی نشان داد که هیبرید شماره ۸ برای صفت عملکرد دانه و هیبرید شماره ۱۲ برای صفت تعداد دانه پر در خوشه و هیبرید شماره ۱۵ برای صفت طول خوشه SCA مثبت و معنی داری داشتند.

واژه‌های کلیدی: برنج، تجزیه لاین × تستر، ترکیب پذیری، عمل ژن

راهکارهای مهم در افزایش تولید استفاده از واریته‌های اصلاح شده براساس دورگ‌گیری است. یکی از اولین تصمیمات در امر دورگ‌گیری انتخاب والدین می‌باشد. در اصلاح نباتات ترکیب ژنتیکی بعضی ژنتیپها می‌تواند منجر به ایجاد نتاج برتر از نظر بعضی صفات گردد در حالی که نتاج حاصل از تلاقی والدین نسبتاً خوب ممکن است نامطلوب و حتی مایوس کننده باشد. بعضی از ژنتیپها برای برخی از صفات دارای قابلیت ترکیب

مقدمه

برنج (Oryza sativa L.) یکی از محصولاتی است که حدود دو سوم کالری مورد نیاز مردم آسیا از آن تأمین می‌شود و یکی از غذاهای اصلی مردم ایران نیز می‌باشد. تولید این محصول در کشور برای نیاز سالانه کافی نبوده بنابراین هر ساله مقداری از خارج وارد می‌گردد، برای رفع کمبود و جلوگیری از واردات لازم است که میزان تولید را افزایش داد. یکی از

و تسترها گزارش نمودند و فقط یکی از تسترها برای صفت عرض دانه GCA معنی دار نداشته است (۱۸).

لاآونیا و همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که ترکیب‌پذیری عمومی کلیه لاینهای و تسترها برای صفت روز تا ۵۰٪ گلدهی در سطح ۱٪ معنی دار بود. ۴ لاین و ۵ تستر برای ارتفاع بوته GCA معنی داری داشتند. تمامی لاینهای ۲ و ۲۰۰۰ تستر GCA معنی داری برای صفت تعداد پنجه داشتند. تعداد ۴ لاین و همه تسترها برای صفت گلچه‌های بارور شده GCA معنی داری داشتند (۱٪) و ۴ لاین و ۵ تستر برای عملکرد دانه در سطح ۱٪ معنی دار بوده است. اثرات ترکیب‌پذیری خصوصی ۳ هیبرید در صفت ارتفاع بوته در سطح ۱٪ معنی دار بود. ۳ هیبرید SCA برای صفت تعداد پنجه در گیاه دارا بودند و ۶ هیبرید SCA برای صفت تعداد دانه در خوشة در سطح ۱٪ معنی دار بوده است. ۶ هیبرید SCA تفاوت بسیار معنی داری برای صفت تعداد دانه در خوشة داشتند. ۵ هیبرید برای صفت گلچه‌های بارور SCA در سطح ۱٪ معنی دار بوده است و بالاخره ۹ هیبرید SCA تفاوت معنی داری برای صفت عملکرددانه نشان داد (۱۴). زو و ویرمانی (۲۰۰۰) در بررسی که روی ۶۶ هیبرید و ۱۰ تستر و ۲۳ لاین پیشرفت‌هه انجام دادند برای عملکرد دانه واریانس غالیت را (۸۳/۷)، واریانس افزایشی را (۳۱/۸) گزارش نمودند. برای صفت وزن دانه واریانس غالیت را (۰/۰۸) واریانس افزایشی (۰/۰۸۸) و برای صفت طول خوشة واریانس افزایشی (۰/۰۲۸۷) واریانس غالیت (۰/۱۵۳) گزارش کردند (۱۹).

محمدصالحی و همکاران (۱۳۷۷) ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی معنی داری را برای صفات طول خوشة، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، طول و عرض دانه در ۸ رقم برنج را گزارش نمودند (۴). کیانوش (۱۳۷۹) ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات روز تا ۵۰٪ گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم، طول خوشة، طول و عرض دانه، تعداد دانه پر در خوشة و وزن هزار دانه در سطح ۱٪ معنی دار نشان دادند که مبین وجود نوع ژنتیکی افزایشی و غیر افزایشی است (۲).

نعمت زاده و همکاران (۱۳۷۹) در آزمایشی که به منظور قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و اثرات ژن انجام دادند برای کلیه صفات تاریخ گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، طول خوشة، عملکرد تک بوته و وزن هزار دانه

پذیری خوبی با ژنتیپهای دیگر می‌باشد که می‌توانند به عنوان والدین اصلی و مهم در اکثر برنامه‌های دورگ گیری مورد استفاده قرار گیرند. برای اصلاح واریته‌های پرمحصول نیاز به اطلاعات جامعی در مورد ساختار ژنتیکی والدین مورد تلاقی و همچنین ترکیب‌پذیری صفات مطلوب آنها می‌باشد. ترکیب‌پذیری در روش‌های اصلاحی جوامع گیاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به خصوص آنکه مطالعه دقیق ترکیب‌پذیری می‌تواند در رابطه با انتخاب روش‌های اصلاحی لاین‌ها در ترکیبات هیبریدی مفید واقع گردد. برآوردقابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی با استفاده از تلاقی‌های دای آلل و نیز از طریق تلاقی‌های تاپ کراس صورت می‌گیرد. تجزیه لاین × تستر نوعی روش مثل تاپ کراس است که در آن به جای یک تستر چندین تستر بکار می‌رود. در این روش علاوه بر برآوردن ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی، اثرات ژنهای را نیز می‌توان بدست آورد (۳). برای انجام هر برنامه اصلاحی، اطلاع از ساختار ژنتیکی، چگونگی کنترل صفات توسط ژنهای و نیز قابلیت ترکیب‌پذیری صفات ضروری است (۱۶). مشخص نمودن ترکیب‌پذیری لاینهای و بخش افزایشی و غیر افزایشی واریانس ژنتیکی در کنترل صفات، اساس تصمیم گیری در موردنحوه استفاده از اژرم پلاسمهای موجود است که محققین مختلف برایه روش‌های متعدد نسبت به برآوردن آنها اقدام می‌نمایند.

دهالیوال و شارما (۱۹۹۰) گزارش نمودند که SCA و GCA برای صفات روز تا ۵۰٪ گلدهی، طول خوشة، تعداد دانه در خوشة، وزن ۱۰۰۰ دانه و عملکرد دانه در بوته معنی دار بوده است که مبین وجود واریانسهای ژنتیکی افزایشی و غیر افزایشی برای صفات مذکور بوده و واریانس غیر افزایشی بر افزایشی برای تمام صفات مذکور فزونی داشته است (۹). گوین و همکاران (۱۹۹۳) در بررسی روی برنج ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی معنی دار را برای صفت عملکرد دانه گزارش نمودند که نشانده‌های اهمیت عمل افزایشی و غیر افزایشی ژنی و برتری عمل غیر افزایشی ژنی بر نوع افزایشی در کنترل این صفت می‌باشد (۱۱). در پژوهشی که وی وی کاناندان و چیریداران (۱۹۹۵) روی ۵ لاین و ۳ تستر بروش تلاقی لاین × تستر انجام دادند، اثرات ترکیب‌پذیری عمومی معنی داری (در سطح ۰/۵) را برای صفات عملکرد دانه، طول دانه و عرض دانه برای همه لاینهای

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس برای صفات مختلف نشان داد که اثر تلاقی‌ها برای کلیه صفات مورد بررسی به جز صفت تعداد پنجه در سطح ۱٪ و برای صفت تعداد پنجه در سطح ۵٪ معنی‌دار شده و برای صفت طول دانه معنی‌دار نشده که نشان دهنده تنوع ژنتیکی کافی بین تلاقی‌ها از نظر صفات فوق می‌باشد (جدول ۱). تجزیه اثر تلاقی‌ها به اجزاء خود بر مبنای تجزیه لاین \times تستر نشان داد که اثر لاینهای برای کلیه صفات به جز تعداد پنجه و وزن هزار دانه در سطح ۱٪ معنی‌دار بود و برای تعداد پنجه و وزن هزار دانه در سطح ۵٪ معنی‌دار بود و برای صفت طول دانه معنی‌دار نبود. اثر تسترها برای صفات ارتفاع بوته طول برگ پرچم، طول خوشة، تعداد دانه پوک در خوشة و وزن هزار دانه در سطح ۱٪ و برای صفت عملکرد دانه در سطح ۵٪ معنی‌دار بوده و برای بقیه صفات معنی‌دار نبود. اثر لاین \times تستر برای صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه پوک در خوشه و عملکرد دانه در سطح ۱٪ و برای صفات عرض برگ پرچم، طول خوشه و تعداد دانه پر در خوشه در سطح ۵٪ و برای بقیه صفات معنی‌دار نبود. برآورد اثرات ترکیب‌پذیری عمومی لاینهای و تسترها در جدول ۲ نشان داده شده است. بر طبق نتایج این جدول لاین شماره ۲ و تسترها ۱ و ۲ به خاطر GCA منفی و معنی‌دار در سطح ۱٪ می‌تواند به عنوان کاهنده ارتفاع به شمار آیند. لاین شماره ۵، GCA مثبت و معنی‌دار در سطح ۱٪ و تستر شماره ۳ GCA، GCA مثبت و معنی‌دار در سطح ۵٪ برای صفت طول برگ پرچم داشته بنابراین می‌توانند افزایینده این صفت در نتاج باشند. لاینهای شماره ۳ و ۴ بدلیل دارا بودن GCA مثبت و معنی‌دار در سطح ۱٪ می‌توانند افزایینده صفت عرض برگ پرچم در نتاج باشد. لاین ۱ و تستر ۳ دارای GCA مثبت معنی‌دار در سطح ۵٪ برای صفت طول خوشه بوده و می‌تواند این صفت را به نتاج منتقل کرده و عملکرد را افزایش دهدن. لاین شماره ۴ بدلیل دارا بودن GCA مثبت و معنی‌دار در سطح ۱٪ برای صفت تعداد دانه پر در خوشه می‌تواند باعث افزایش عملکرد دانه شود. لاین شماره ۴ و تستر ۳ بدلیل GCA منفی و معنی‌دار در سطح ۵٪ می‌تواند کاهنده صفت تعداد دانه پوک در خوشه باشد. لاین ۶ GCA مثبت و معنی‌دار در سطح ۵٪ داشته که می‌تواند باعث افزایش طول دانه در نتاج خود گردد.

SCA در سطح ۱٪ معنی‌دار وجود دارد که بیانگر وجود اثرات ژنتیکی افزایشی و غیرافزایشی برای صفات مذکور می‌باشد (۵).

هدف از این تحقیق هدف، تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و اثرات ژنهای در کنترل صفات مختلف در لاینهای و تسترهای موردنبررسی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

به منظور برآورد ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثرات زن تعداد ۶ لاین به اسمی : ۲۷۳۴۸-۹-۴-۴، ۲۷۳۴۳-۲-۱-۱، ۲۷۳۴۳-۲-۱-۲، ۲۷۳۶۹-۵-۱-۱-۱، ۲۷۳۶۲-۱-۱-۱، ۲۷۳۲۷-۷-۱-۱ به عنوان پایه پدری و تعداد ۳ تستر به نامهای ندا و نعمت و طارم محلی به عنوان پایه پدری از طریق تلاقی لاین \times تستر مورد مطالعه قرار گرفتند. در سال اول هریک از لاینهای با ۳ تستر تلاقی داده شد. در سال دوم ۱۸ نتاج F₁ حاصل به همراه ۶ لاین و ۳ تستر (۷ تیمار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برج معاونت مازندران (آمل) کشت شدند. ژنتیکها بصورت تک بوته و به فاصله ۲۵ سانتی متر و در هر خط به تعداد ۱۵ عدد کشت گردید برای حذف اثر حاشیه دوطرف هر خط ارقام متفرقه کشت شدند.

صفات مورد بررسی عبارتند از:

ارتفاع بوته (سانتی‌متر)، طول برگ پرچم (سانتی‌متر)، عرض برگ پرچم (سانتی‌متر)، تعداد پنجه مفید، طول خوشه (سانتی‌متر)، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک در خوشه، طول دانه (میلی‌متر)، عرض دانه (میلی‌متر)، وزن هزار دانه (گرم)، تعداد روز تا رسیدگی و عملکرد دانه تک بوته (گرم).

به منظور برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثرات زن از هر خط تعداد ۱۰ بوته بطور تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس برای صفات مذکور انجام شد. برای تجزیه‌های بیشتر اثرات تلاقی‌ها به اجزا آن و همچنین محاسبه واریانس افزایشی و غیر افزایشی از روش پیشنهادی کمپتوون (۱۹۵۷) استفاده گردید (۱۳). آزمون اثرات ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی لاینهای و تسترهای با استفاده از آزمون t صورت گرفت.

جدول ۱- نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف مورد مطالعه در پرنج بر اساس تلاقي لاین × تستر

ارتفاع بوته	میانگین مربعات										منابع تغییرات آزادی درجه	
	عملکرد دانه	تعداد روز	وزن هزار	تعداد دانه پوک	عرض برگ	طول برگ	عرض برگ پرچم	طول خوشه	تعداد پنجه	طول خوشه در خوشه		
۱۱۷/۱۴۸ ^{ns}	۶۳/۰۵۹**	۰/۰۳۷**	۸۴/۴۶۳*	۱/۳۱۸	۷۴۴/۵۳۱	۴۰/۴۷۷۸ ^{ns}	۰/۹۴۶*	۰/۰۱۲ ^{ns}	۲۳/۹۵۶**	۲۴/۴۵۷**	۱۳۶/۱۶۹ ^{ns}	۲ تکرار
۱۲۳/۵۱۲**	۷۹/۷۱۲**	۰/۰۹۸**	۴۳/۲۷۴**	۲۱/۴۴۳**	۲۲۷۵/۱۶۶**	۲۰۳۱/۸۵**	۰/۰۵۰*	۰/۰۲۸**	۱۵/۸۲۵**	۵۰/۱۱۵**	۶۵۳/۵۸۱**	۲۶ تیمار
۱۰۸/۱۳۴**	۷۹/۰۵۹**	۰/۱۴۸**	۴۲/۷۰۴*	۳۰/۴۵۴**	۲۷۴۳/۳۳**	۰۵۷/۱۲۰ ^{ns}	۰/۸۴۴**	۰/۰۲۶**	۱۲/۳۶۹*	۷۴/۶۷۶**	۱۱۹/۱۳۹ ^{ns}	۸ والدین
۱۱۸/۰۹۷۳**	۷۳/۹۹۱**	۰/۰۷۹**	۳۴/۰۶۱*	۱۴/۶۴۸**	۲۰۹/۱۲۳**	۲۶۵۴/۸۴۲**	۰/۰۲۷۸ ^{ns}	۰/۰۲۰**	۱۱/۶۵۶**	۳۹/۸۷۵**	۶۰۸/۷۵۰**	۱۷ تلاقی‌ها
۳۵۰۰/۰۰۵۶*	۱۷۸/۶۰۵**	۰/۰۲۲ ^{ns}	۲۰۴/۴۶۹**	۶۴/۸۵۳**	۱۶۷۵/۰۶۲ ^{ns}	۳۲۲۶/۷۲۲**	۰/۰۰۱	۰/۰۱۶۷**	۱۱۴۲۴۱**	۲۷/۷۱۰**	۵۶۹۱/۱۲۲۰**	۱ والدین در مقابل تلاقی‌ها
۶۹۰/۰۶۴**	۹۶/۴۸۵**	۰/۰۲۳۶**	۵۶/۹۶۳*	۱۷/۳۷۱**	۲۱۴۳/۴۸۵**	۳۰۳۸/۰۵۰**	۰/۰۵۵۸ ^{ns}	۰/۰۳۱**	۱۱۹۸۵*	۱۲۰/۸۶۳**	۳۲۵/۹۲۳ ^{ns}	۵ لاین‌ها
۷۷۲۷/۰۱۹**	۳۳۶/۳۴۶**	۰/۰۱۵ ^{ns}	۲۹/۴۰۷ ^{ns}	۵۵/۰۵۸۸**	۶۱۹/۱۳۰ ^{ns}	۷۴۸/۰۵۷۴**	۰/۰۵۶۰ ^{ns}	۰/۰۲۴ ^{ns}	۳۱/۹۵۰**	۱۰/۰۵۷۴ ^{ns}	۶۳۲/۰۵۰۱*	۲ تسترهای
۲۱۷/۲۱۹	۱۰/۲۷۳ ^{ns}	۰/۰۱۳*	۲۲۳/۰۴۱ ^{ns}	۵/۰۹۹*	۱۳۵۷/۶۴۱*	۱۴۹۷/۸۶۳**	۰/۰۲۳۲ ^{ns}	۰/۰۱۸۴۶ ^{ns}	۷/۰۴۳۷ ^{ns}	۵/۰۲۴۱ ^{ns}	۷۴۵/۰۴۱۳**	۱۰ لاین × تستر
۶۱/۱۹۹	۸/۰۱۷	۰/۰۰۷	۱۸/۷۴۳	۲/۰۵۰	۵۲۰/۰۴۶۷	۳۱۰/۰۵۰۹	۰/۰۲۸۰	۰/۰۰۸	۴/۰۴۶۴	۳/۰۸۵۴	۱۷۹/۰۵۸۳	۵۲

* و ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح ۰/۵ و ۰/۱ ns

جدول ۲- پرآوردهای ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) لاین‌ها و تسترهای برای صفات مورد مطالعه در برنج بر اساس تلاقي لاین × تستر

متای تغییرات	ارتفاع بوته (cm)	طول برگ پرچم (cm)	عرض برگ پرچم (cm)	تمددینجه	دانه پوشش خوش (mm)	دانه پوشش درخواسته	طول دانه (mm)	عرض دانه (mm)	وزن هزاردانه (gr)	روزتارسیدگی بوته	عملکردانه تک
لاین ۱	-۳/۶۹۸۱	۰/۹۰۱۹	۰/۹۰۱۹	-۰/۰۷۲۱	۱/۳۹۸۱	۱/۷۷۵۹۳	-۰/۰۱۰۰	-۰/۰۱۰۵	-۱/۰۵۳۷	-۰/۰۵۷۰	-۱/۰۵۷۲
لاین ۲	-۳/۷۲۰۴	-۰/۱۷۱۶	-۰/۱۷۱۶	-۰/۰۸۳۰	-۱/۱۷۸۶	۲۲/۳۷۸۲	-۰/۰۱۰۵	-۰/۰۱۰۵	-۰/۰۹۴۴۶	-۰/۰۷۰۱۹	-۰/۰۷۰۱۹
لاین ۳	۰/۷۴۰۷	۰/۷۴۳۰	۰/۷۴۳۰	-۰/۰۱۰۹	۱/۱۲۹۶	-۲/۲۴۰۷	-۰/۰۱۰۷	-۰/۰۱۱۱	-۰/۰۷۷۸	۰/۱۹۸۱۵	-۰/۰۷۷۷
لاین ۴	-۳/۸۲۱۵	-۰/۱۶۳۰	-۰/۱۶۳۰	-۰/۰۷۰۰	-۰/۰۷۰۱۸۵	۳۷/۱۸۵	-۰/۰۱۰۷	-۰/۰۱۰۸۹	-۰/۰۲۲۴۱	۰/۱۹۸۱۵	-۰/۰۷۷۷۸
لاین ۵	-۳/۸۲۱۸	۰/۷۴۳۰	۰/۷۴۳۰	-۰/۰۷۴۳	۱/۱۷۵۹	-۱/۱۷۸۷	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۷۰۱۹	-۰/۰۷۰۱۹	-۰/۰۷۰۱۹
لاین ۶	۰/۱۶۳۰	۰/۱۶۳۰	۰/۱۶۳۰	-۰/۰۷۴۳	۱/۱۷۵۹	۱/۹۲۵۹	-۰/۰۱۰۰	-۰/۰۱۰۵	-۰/۰۹۴۴۶	-۰/۰۷۰۱۹	-۰/۰۷۰۱۹
لاین ها S.E.	۰/۱۶۷۷	۰/۱۶۷۷	۰/۱۶۷۷	-۰/۰۷۴۳	۱/۱۷۵۹	۱/۹۲۵۹	-۰/۰۱۰۰	-۰/۰۱۰۵	-۰/۰۹۴۴۶	-۰/۰۷۰۱۹	-۰/۰۷۰۱۹
تستر ۱	-۷/۰۲۰۴	-۰/۷۰۱۵	-۰/۷۰۱۵	-۰/۰۱۰۲	-۱/۱۸۰۵	-۱/۱۷۸۳	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۵۱۹	-۰/۰۵۱۹	-۰/۰۵۱۹
تستر ۲	-۷/۰۲۰۶	-۰/۷۰۱۷	-۰/۷۰۱۷	-۰/۰۱۰۲	-۰/۰۷۰۱۷	-۰/۰۷۰۱۷	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۵۱۹	-۰/۰۵۱۹	-۰/۰۵۱۹
تستر ۳	-۷/۰۲۰۷	-۰/۷۰۱۸	-۰/۷۰۱۸	-۰/۰۱۰۲	-۰/۰۷۰۱۸	-۰/۰۷۰۱۸	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۱۰۳	-۰/۰۵۱۹	-۰/۰۵۱۹	-۰/۰۵۱۹
S.E. تسترها	۰/۱۶۷۷	۰/۱۶۷۷	۰/۱۶۷۷	-۰/۰۷۴۳	۱/۱۷۵۹	۱/۹۲۵۹	-۰/۰۱۰۰	-۰/۰۱۰۵	-۰/۰۹۴۴۶	-۰/۰۷۰۱۹	-۰/۰۷۰۱۹

*، **: به ترتیب تفاوت معنیدار، د، سطح ۵٪ و ۱٪

تست‌ها: ۱) ندا ۲) نعمت ۳) طام محلی

دانه پوک در خوشة هیبرید شماره ۵ SCA، منفی و معنی دار بوده که می‌توانند باعث افزایش عملکرد از طریق هیبریداسیون گردد. نتایج فوق با گزارشات بسیاری از محققین مطابقت دارد (۱۹، ۵).

نتایج اجزا واریانس ژنتیکی (جدول ۵) نشان داد که برای صفات ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و روز تا رسیدگی واریانس افزایشی ژنی مقادیر بیشتری از واریانس غیرافزایشی ژنی دارد و باء، صفات عملکرد دانه و احنا عملکرد مثا، تعداد بینجه، طما.

لاین‌های شماره ۲ و ۴ به خاطر دارا بودن GCA منفی و معنی‌دار در سطح ۵٪ می‌تواند باعث انتقال صفت زودرسی به نتاج خود گردد. برآورد اثرات ترکیب پذیری خصوصی (جدول ۳) نشان می‌دهد که SCA هیبرید شماره ۸ مثبت و معنی‌دار در سطح ۱٪ بوده و می‌تواند باعث افزایش عملکرد از طریق هیبریداسیون گردد. برای صفات اجزا عملکرد مانند طول خوشة هیبرید شماره ۱۵ و برای تعداد دانه پر در خوشة هیبرید شماره ۱۲ SCA مثبت و معنی‌دار در سطح ۰.۵٪ و برای صفت تعداد

جدول ۳- پرآوردهای تکیب‌پذیری خصوصی SCA همیزی‌ها برای صفات مختلف مورد مطالعه در پرچم بر اساس تلاقی لاین × نسخه

جدول ۴ - مقایسه میانگین تیمارها بر اساس دانکن در سطح ۱٪ برای صفات مختلف مورد مطالعه در بروج

جدول ۵- مقایسه میانگین تیمارها بر اساس دانکن در سطح ۱٪ با صفات مختلف مورد مطالعه در برج

عرض دانه و تعداد روز تا رسیدگی بهتر است از روش‌های کلاسیک اصلاحی (گرینش) استفاده کرد و برای اصلاح صفاتی مثل طول خوش، تعداد دانه پر در خوش، تعداد دانه پوک در خوش، یا به عبارتی صفات اجزا عملکرد و عملکرد از روش هیبریداسیون استفاده کرد.

خوش، تعداد دانه پر در خوش و وزن هزاردانه مقادیر واریانس غیرافزاشی بیش از واریانس افزایشی است.

با توجه به نتایج ترکیب‌پذیری‌های عمومی و خصوصی و اجزا واریانس ژنتیکی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که برای اصلاح صفاتی همچون ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول و

REFERENCES

منابع مورد استفاده

- چوگان، ر. ۱۳۷۸. برآورد قابلیت ترکیب پذیری، واریانس افزایشی و غالیت صفات در لاینهای ذرت با استفاده از تلاقی لاین × تستر. مجله نهال و بذر، جلد ۱۵، شماره ۱، ص ۴۷-۵۵.
- کیانوش، غ. ۱۳۷۹. بررسی قابلیت ترکیب پذیری، برآورده‌روزیس و همبستگی بعضی صفات مهم در برنج، خلاصه مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.
- فرشادفر، ع. ۱۳۷۶. کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات. انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه. جلد اول ۵۲۸ صفحه.
- محمدصالحی، م، پ. وجودانی و ع. ترنگ. ۱۳۷۷. تعیین ترکیب پذیری ارقام برنج به روش دای آلل. خلاصه مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.
- نعمت زاده ق، ح. دونلو، و ر. مانی و م. یزدانی. ۱۳۷۹. تعیین قابلیت ترکیب پذیری و نوع اثرات ژن در ارقام برنج بروش دای آلل. خلاصه. مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات
- Ali, S. S., S. Jahanger, H. Jafri, & M. A. Butt. 1995. Diallel analysis for combining ability in rice. plant Breeding Abstracts. 65:3:369.
- Bobby. T. P. M., & N.Nadarajan. 1994. Genetic analysis of yield components in rice involving CMS lines. Plant Breeding Abstracts.64:2:217.
- Camstock.R.E. 1979. Inbred lines.vs.the population as tester in recurrent selection. Crop Sci.19:881-886.
- Dhaliwal. T. S., & H.L.Sharma. 1990. Combining ability and maternal effects for agronomic and grain charcters of rice. MS.c. thesis. 27: 122: 128.
- Gong. G. M. 1993. Analysis of the Combining ability of main agronomic trait of Indica double functional genetic male sterility line. Chinese Jornal of Rice Science.7:3,137-142.
- Guyen. N. 1993. Combining ability and heterosis for some physiological traits in rice IRRI Note.18:1:7.
- Kauchic, R. & P. Sharma.1989. Gene action and Combining ability for yield and yield components characters in rice under cold strees condition .Rice Abstracts. 12:4:177.
- Kempforn. O.1975. An introduction to genetic statistics.John Wiley and Nordskoy .Inc. London, Champman and Hall, LTD.
- Lavania.C.R,R.Vijay Kumar.1997. Combining ability of rice cultivar with CMS lines.IRRI Nots, 22:2:16-17.
- Parasad.G.S. & M.V.S., Sastry. 1991. Line x tester analysis for Combining ability and heterosis in brown plant upper resistance varieties. Rice Abstracts.14:2:58.
- Polman.O.1987. Breeding field crops.3rd edition. Van Nostran Drein Hold, New York.
- Singh. N. K. & V.K.Sharma.1995. Components of genetic variation in yield trait of Rice Plant Breeding Abstracts.65:2:201.
- Vive. K., & S. Giridharan. 1995. General Combining ability for kernel traits in rice. IRRI Nots:20(1).
- Xu.W. & S. S. Virmani. 2000. Prediction of hybrid performance in rice. IRRI Nots:25(3).